











Diagrama de flujo del tratamiento de la hipoglucemia



Ejemplos de hidratos de carbono de acción rápida:




Refresco



1-2 pastillas





50-100 ml de zumo con azúcar





Mi tratamiento de la hipoglucemia

Blog Disponible







Cómo interpretar los valores de Cetonas en Sangre



Es muy importante que controle con frecuencia sus niveles de glucemia en estas situaciones y, en caso de valores superiores a 250 mg/dl, los cuerpos cetónicos en sangre.



Existen medidores de glucemia capilar que, mediante unas tiras específicas, nos permiten medir los cuerpos cetónicos en sangre. Estas tiras se utilizan igual que las de medición de glucemia capilar.



Actuación recomendada según el nivel de cuerpos cetónicos en sangre

Cetona en sangre	Interpretación	Actuación
0,0 - 0,5 mmol/l	Negativo	Aplicar pauta de corrección de insulina como le ha indicado su profesional sanitario
0,5 - 1,0 mmol/l	Indicios	Controlar los niveles de glucosa y cetona. Adoptar las medidas preventivas indicadas por su profesional sanitario
1,0 - 3,0 mmol/l	Cetosis	Contactar con su profesional sanitario. Adoptar las medidas correctoras indicadas por su profesional sanitario
Mayor de 3,0 mmol/l	Acidosis	Acudir al hospital

1. Administra un bolus corrector con la bomba
2. Vuelve a medir la glucosa pasada 1 hora

1. Administra una dosis correctora con una pluma
2. Cambia el equipo de infusión
3. Resuelve el problema de la bomba
4. Mide la glucosa cada 1-2 horas. Administra bolus correctores según proceda

Si el valor de la glucosa es el mismo o superior:

Administra una dosis correctora con una jeringa
Cambia el equipo de infusión
Continúa midiendo la glucosa cada hora hasta

CETOSIS, SINTOMAS:

